



CAPTAN 50 WP
AVGUST

Ficha Técnica

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Mojable (WP)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	2649
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	500 g, 1 kg, 25 kg.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Captan500 g/kg Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	CAPTAN 50 WP AVGUST es un fungicida de contacto con acción preventiva para la aplicación en aspersión foliar, así como para la desinfección del suelo, de la semilla y de las plántulas antes de su trasplante. Actúa por interferencia en el mecanismo de respiración por lo que inhibe la germinación de las esporas y dificulta el crecimiento y desarrollo micelar.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
PAPA	GOTA (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 kg/ha	3	4
TOMATE	MOHO GRIS (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 kg/ha	1	4
UCHUVA				

Juntos crecemos bien

avgust 
crop protection



CAPTAN 50 WP
AVGUST

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
LULO	MOHO GRIS (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 kg/ha	1	4
TOMATE DE ÁRBOL				
AJÍ				
PIMENTÓN				
BERENJENA				
AJÍ DULCE				
FRESA	MOHO GRIS (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 kg/ha	1	4
ARANDANO ALTO				
ARANDANO OJO DE CONEJO				
ARANDANO CRAMBERRY				
FRAMBUESA				
MORA				
BREVO				
UVA				
FRIJOL	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0.5 kg/ha	1	4
ARVEJA CHINA				

Juntos crecemos bien

avgust 
crop protection



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARVEJA DULCE	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0.5 kg/ha	1	4
GUANDUL				
HABICHUELA				
HABICHUELIN				
CAUPI				
KUDZU				
CEBOLLA	MANCHA PÚRPURA (<i>Alternaria porri</i>)	1.0 kg/ha	3	4
CEBOLLA LARGA				
CEBOLLÍN				
CEBOLLÍN CHINO				
PUERRO				

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **CAPTAN 50 WP AVGUST** de acuerdo a la tabla de uso y manejo del producto, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de daño económico, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

CAPTAN 50 WP AVGUST se puede aplicar por vía terrestre y en forma dirigida al suelo, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco



CAPTAN 50 WP
AVGUST

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, agite bien el envase antes de dosificar, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 600 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Altamente tóxico para abejas."
- "Puede matar abejas y polinizadores."
- "No aplicar el producto en presencia de abejas o en época de floración del cultivo."
- "No aplicar en horas de alta actividad de abejas."
- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."
- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."
- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



V03-CO-13/09/2023

Juntos crecemos bien

avgust crop protection